



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych**

Oznaczenie arkusza: **R.10-01-16.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **R.10**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Wynik badania w kierunku parwowirusy

1	Wyjęta z opakowania kasetka z testem, na której widać ślady użycia (np. w owalnym okienku ślad płynu)						
2	Obecna linia kontrolna w okienku testu (na wysokości litery C)						
3	Wpisany prawidłowy wynik testu do „Książki leczenia zwierząt” (dwie kreski na C i T – wynik dodatni, jedna kreska na C – wynik ujemny)						

Rezultat 2. Przygotowany do podania płyn Ringera

1	Wybrany do podania płyn Ringera/sol. Ringeri/ solutio Ringeri (należy zwrócić uwagę, żeby to nie był płyn Ringera z mleczanami)						
2	W butelkę/worek z płynem wbita końcówka aparatu do przetaczania						
3	W zbiorniczku aparatu do przetaczania jest płyn i powietrze (tak żeby było widać z jaką częstotliwością kapie przetaczany płyn podczas podawania)						
4	W całej rurce aparatu do przetaczania jest płyn (usunięte jest powietrze)						
5	Zakręcony jest zaworek (płyn nie cieknie przez igłę po odwróceniu i podniesieniu butelki/worka)						
6	Po odwróceniu i podniesieniu butelki/worka do góry nogami, płyn nie kapie z dziury po wbiciu aparatu do przetaczania						
7	Na drugim końcu aparatu założona jest igła						
8	Zdający wybrał igłę 0,8, 0,9 lub 1,2 (zielona, żółta lub różowa)						
9	Igła jest w sterylnej osłonce (plastikowej)						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Przygotowany do podania Linco-Spectin

1	W strzykawce jest płyn						
2	Zdający wybrał strzykawkę 2 ml						
3	W strzykawce jest 1,4 ml płynu (tolerancja 0,1 ml - 1 kreseczka)						
4	W strzykawce nie ma pęcherzyka powietrza						
5	Zdający wybrał igłę 0,5 lub 0,6 (niebieska lub pomarańczowa)						
6	Igła jest w sterylnej osłonce (plastikowej)						

Rezultat 4. „Książka leczenia zwierząt...”

1	W rubryce „Data i godzina...” poprawnie wpisana data i godzina (20.12.2015 r godz 19:00)						
2	W rubryce „Imię, nazwisko...” poprawnie wpisane dane właściciela z adresem						
3	W rubryce „Opis leczzonego zwierzęcia...” wpisane: pies, mieszaniec, 4 m-ce (lub ur. 17.08.2015 r)						
4	W rubryce „Dane uzyskane...” wpisane: biegunka, wymioty (dopuszczalny inny wpis opisujący podane objawy)						
5	W rubryce „Nazwa, ilość, dawkowanie...” wpisane płyn Ringera/sol. Ringeri/solutio Ringeri						
6	W rubryce „Nazwa, ilość, dawkowanie...” wpisana ilość płynu Ringera 140 ml						
7	W rubryce „Nazwa, ilość, dawkowanie...” wpisane Linco-Spectin						
8	W rubryce „Nazwa, ilość, dawkowanie...” wpisana ilość preparatu Linco-Spectin 1,4 ml.						
9	W rubryce „Wynik badań...” wpisane: test CPV Ag i wynik testu (dopuszczalny inny wpis o wykonaniu testu w kierunku parwowirusy)						
10	Rubryka „Podpis i pieczęć...” nie zawiera nazwiska zdającego/zdający nie podpisał się jako lekarz weterynarii						

Numer
stanowiska

Przebieg wykonania testu w kierunku parwowirusy						
1	Przed przystąpieniem do testu założył fartuch ochronny i rękawiczki					
2	Wyjął płytkę z testem oraz pipetkę z opakowania					
3	Odkręcił probówkę z rozcieńczalnikiem przed zanurzeniem wacika w kale					
4	Zanurzył wacik na patyczku w próbce kału					
5	Wacik z niewielką ilością kału zanurzył w rozcieńczalniku					
6	Wyjmując wacik z rozcieńczalnika odsączył go na ściance probówki					
7	Nabrał do pipety płyn, tak żeby wystarczyło do nakropienia 4 kropli (ponad połowa balonika pipety, ale nie do końca pipety)					
8	Nakropił 4 krople płynu w owalne okienko					
9	Nastawił minutnik na minimum 5, maksimum 10 minut					
10	Podczas pracy nie wykonywał notatek ani innych czynności					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis