

Ulotka informacyjna – opracowanie własne na podstawie ulotki informacyjnej dla pacjenta

Paracetamol Accord, 500 mg, tabletki

Paracetamololum

Substancją czynną leku jest paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych.

Każda tabletki zawiera 500 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Lek Paracetamol Accord jest stosowany w celu łagodzenia bólu i obniżania gorączki. Tabletki mogą być stosowane w leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

Lek Paracetamol Accord może być stosowany u dorosłych i młodzieży, nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjmowanie paracetamolu z jedzeniem i pić nie ma wpływu na skuteczność produktu leczniczego.

Nie należy spożywać dużych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Paracetamol Accord.

Dawkowanie:

Wyłącznie do stosowania doustnego.

1 lub 2 tabletki (500-1000 mg paracetamolu), jeśli jest to konieczne, można powtarzać co 4 do 6 godzin, aż do 6 tabletek (3000 mg paracetamolu) w ciągu 24 godzin.

Tabletkę należy połykać w całości popijając dużą ilością wody. Ewentualnie, rozpuścić tabletkę w dużej ilości wody, dobrze wymieszać przed wypiciem.

Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi paracetamol.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasila się lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować Paracetamolu Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.